

Приложение 10
к Регламенту взаимодействия участников
иторинга распространения резистентных к
имикробным препаратам возбудителей
питательных инфекций в Санкт-Петербурге

Перечень эпидемиологических критериев для направления изолятов микроорганизмов в подразделение № 2 (все виды, за исключением *Streptococcus spp.*) и подразделение № 4 лаборатории, выполняющей референтные исследования (только *Streptococcus spp.*) для проведения молекулярно-генетического типирования

Все выделенные от пациентов изоляты ежемесячно передаются в подразделение № 2 референс-лаборатории в случаях, которые удовлетворяют хотя бы одному из следующих критериев:

критерий 1. В течение месяца в медицинском учреждении произошло **5 и более случаев** инфекций, вызванных возбудителем одного вида у пациентов, находящихся в одном отделении медицинского учреждения или подвергающихся действию единого фактора риска (однотипной медицинской манипуляции)

ИЛИ

критерий 2. В течение месяца в медицинском учреждении произошло **3 и более случаев** инфекций, вызванных возбудителем одного вида у пациентов, если предполагается внутрибольничный характер инфицирования пациентов.

Внутрибольничное инфицирование пациентов предполагается в следующих случаях: при отсутствии положительного высева микроорганизма из клинического материала при первом микробиологическом обследовании пациента (при поступлении) и наличии высева микроорганизма у того же пациента при последующих микробиологических исследованиях или при высева микроорганизма у пациента, находящегося на стационарном лечении в течение более 48 часов

ИЛИ

критерий 3. Эпидемиолог предполагает наличие групповой заболеваемости (вспышки).

ИЛИ

критерий 4.

2 и более случаев инфекций, интерпретированных как внутрибольничное инфицирование или занос, вызванных необычным или впервые идентифицированным в медицинской организации видом возбудителя